

2016 考研数学一真题【完整版】

新东方在线

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分.下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的.

(1) 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛，则

(A) $a < 1$ 且 $b > 1$.

(B) $a > 1$ 且 $b > 1$.

(C) $a < 1$ 且 $a+b > 1$.

(D) $a > 1$ 且 $a+b > 1$.

(2) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是

(A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1. \end{cases}$

(B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) - 1, & x \geq 1. \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$

(D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$

(3) 若 $y = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$ 和 $y = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解，则 $q(x) =$

(A) $3x(1+x^2)$.

(B) $-3x(1+x^2)$.

(C) $\frac{x}{1+x^2}$.

(D) $\frac{x}{1+x^2}$.

(4) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n=1, 2, \dots, \end{cases}$ 则

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导.

(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

(5) 设 A, B 是可逆矩阵，且 A 与 B 相似，则下列结论错误的是

(A) A^T 与 B^T 相似

(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似

(C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似

(D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似

(6) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ ，则 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为

- (A) 单叶双曲面
(C) 椭球面

- (B) 双叶双曲面
(D) 柱面

(7) 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$, 记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$, 则

- (A) p 随着 μ 的增加而增加
(C) p 随着 μ 的增加而减少

- (B) p 随着 σ 的增加而增加
(D) p 随着 σ 的增加而减少

(8) 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$ 。

将试验 E 独立重复做 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果

A_2 发生的次数, 则 X 与 Y 的相关系数为

(A)

(B)

(C)

(D)



二、填空题：9~14 小题，每小题 4 分，共 24 分.

(9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$

(10) 向量场 $A(x, y, z) = (x + y + z)i + xyj + zk$ 的旋度 $\text{rot}A = \underline{\hspace{2cm}}$.

(11) 设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定, 则

(12) 设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 且 $f'(0) = 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

(13) 行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(14) 设 x_1, x_2, \dots, x_n 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{x} = 9.5$, 参数 σ 置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8, 则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题：15~23 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

(15) (本题满分 10 分)

已知平面区域 $D = \{(r, \theta) \mid 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$ ，计算二重积分 $\iint_D x dx dy$ 。

(16) (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$ ，其中 $0 < k < 1$ 。

(I) 证明：反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛；

(II) 若 $y(0) = 1$ ， $y'(0) = 1$ ，求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 的值。

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$ ，且 $f(0, y) = y + 1$ ， L_t 是从点 $(0, 0)$ 到点

$(1, t)$ 的光滑曲线。计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$ ，并求 $I(t)$ 的最小值。

(18) (本题满分 10 分)

设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成， Σ 为 Ω 整个表面的外侧，计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) dy dz - 2y dz dx + 3z dx dy$ 。

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$ ，且 $f(0, y) = y + 1$ ， L_t 是从点 $(0, 0)$ 到点

$(1, t)$ 的光滑曲线。计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$ ，并求 $I(t)$ 的最小值。

(18) (本题满分 10 分)

设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成， Σ 为 Ω 整个表面的外侧，计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) dy dz - 2y dz dx + 3z dx dy$ 。

(21) (本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(I) 求 A^{99}

(II) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$ 。记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ ，将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合。

(22) (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布，

令 $U = \begin{cases} 1, & X \leq Y. \\ 0, & X > Y. \end{cases}$

(I) 写出 (X, Y) 的概率密度；

(II) 问 U 与 X 是否相互独立？并说明理由；

(III) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$ 。

(23) (本题满分 11 分)

设总体的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数，

X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本，令 $T = \max(X_1, X_2, X_3)$ ，

(I) 求 T 的概率密度；

(II) 确定 a ，使得 aT 为 θ 的无偏估计。